

„Doktornő, valami olcsót, de jót...”

Magisztrális készítmények a háziorvosi gyakorlatban

Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna

(2006. december. 16.)

Magisztrális készítmények, galenikumok

Magyarország példaértékű a patikai technológiákban.

Egyedi összeállítások.

Galenikumok. (Középüzem gyártja.)

Gyógyszerészek szakmai képzettsége világszínvonalú.

1037/2006. sz. törvényjavaslat. (Gyógyszertárnyitáshoz nem szükséges labor, stb.)

Gyógyszerkészítmények formái:

- Gyári gyógyszerkészítmények (specialitások) - *SPECI*
- Magisztrális gyógyszerek - *MAGI*

Speci magiba: 44/2004.(IV. 28.) ESZCSM rendelet 13. §. 5. bekezdés:

- Minden gyári készítmény beletehető, ha a hatóanyaga nem szerezhető be (pl. por alakban)!
- Gyógyszerészek régi beidegződése...
- De: pl. Lidocain por, kenőcs
- Kihaszználható, ha pl. a kenőcsöt higítani kell!

Magisztrális készítmények: hatékonyak és olcsók [TB-támogatás: 2007. április 01.-től 90%-ról 50% -ra módosult].

FoNo: Formulae Normales (Szabványos vényminták).

Bevált magisztrálisok.

Helyi specialitások, egy-egy orvos specialitásai, kórházi összetételek, „helyi FoNo”.

Pl. Kakasszéki bólus, Heller kenőcs, stb.

Felírhatóságuk.

„Törzskönyvezett FoNosok”

Specinek számítanak. Gyártók: Naturland, Parma product, stb.

Például:

- Tabl trikalium citricum
- Tabl. magnesium citricum
- Tabl. analgetica
- Tabl. antidolorica
- Tabl. Chinacisal cum vitamin C
- Tabl. coffeini
- Tabl. phenolphthaleinum comp.
- Ung. infantum
- Sol. antisudorica
- Sol. Castellani sine fuchs.
- Spars. hexachloropheni
- Spir. menthae cum sale
- Supp. analgeticum

- Supp. haemorrhoidale
- Supp. noraminophenazoni 100mg, 200mg.
- Ung. nasale
- Ung. infantum
- Mixt. pect.

A Formulae Normales új kiadása

FoNo VI. – 1987

FoNo VII. – 2005. január 01.-től lépett hatályba (64/2004. sz.ESZCSM rendelet)

Orvosi és gyógyszerészi kiadás.

FoNo VII.

- FoNo VI. bevált készítményeinek átvétele
- Korszerűtlen, elavult készítmények törlése vagy átdolgozása
- Hatékony, korszerűbb, ártalmatlanabb receptek felvétele
- Hatás, ellenjavallat, mellékhatás, interakció, egyéb fontos figyelmeztetések bővebb kidolgozása
- Tartósítókat, konzervánsokat tettek bele
- Orvosi kiadásban a receptek a vényírás szabályainak megfelelően
- Belsőleges készítményeknél szacharóz-, glükóz-, laktóztartalom
- ATC főcsoportok szerint csoportosítva, ezen belül alfabetikus sorrendben
- Magyar Gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica VII.)
- Felsorolás a felvett új készítményekről
- Megváltozott névvel vagy összetétellel felvett készítmények listája
- Sok új fitoterápiás készítmény
- Felhasználási idő 6 hónap (ha nincs külön jelölve)
- Modernebb csomagolási technikák
- Hatáserősségi jelzés
- Pilulák készítésének higiénés problémái
- Új gyógyszerforma: gyógyszeres rúd (pertika) (Pl.: Pertica dithranoli)
- FoNo VII. lekerült a közgyógylistáról!
- Alapanyagok beszerzési problémái
- Korábbi FoNo összetételeit alapanyagonként írni!

Jövő: Európai Gyógyszerkönyv (új nómenklatúra)

Magisztrális készítmények felírása

- Egyes komponenseket birtokos esetben írjuk
 - Mennyiségeket tárgyesetben és aláhúzva írjuk
 - Rövidítések, pl. Scat. orig., Tub. orig., sol., ung., pulv., M. f., D.S.: , ...
 - „dosim semis”, „dosim unam”, „doses duas”
 - Mértékegységek, átváltások
 - Adde, cum, sine
-
- 1 kávéskanál ~ 5 ml
 - 1 gyermekkanál ~ 10 ml
 - 1 evőkanál ~ 15 ml

Latin tőszámnevek

1	I	unus, una, unum
2	II	duo, duae, duo
3	III	tres, tria
4	IV	quattuor
5	V	quinque
6	VI	sex
7	VII	septem
8	VIII	octo
9	IX	novem
10	X	decem
11	XI	undecim
12	XII	duodecim
13	XIII	tredecim
14	XIV	quattuordecim
15	XV	quindecim
16	XVI	sedecim
17	XVII	septemdecim
18	XVIII	duodeviginti
19	XIX	undeviginti
20	XX	viginti
21	XXI	unus et viginti
22	XXII	duo et viginti
28	XXVIII	duodetriginta
29	XXIX	undetriginta
30	XXX	triginta
40	XL	quadraginta
50	L	quinquaginta
60	LX	sexaginta
70	LXX	septuaginta
80	LXXX	octoginta
90	XC	nonaginta
99	IC	undecentum
100	C	centum
101	CI	centum, unus
200	CC	ducenti
300	CCC	trecenti
400	CD	quadrigenti
500	D	quingenti
600	DC	sescenti
700	DCC	septingenti
800	DCCC	octingenti
900	CM	nongenti
1000	M	mille
2000	MM	duo milia
5000	CICC	quinque milia
10 000	CCICC	decem milia
100 000	CCCICCC	centum milia
1 000 000	CCCCICCCC	decies centum milia

FoNo VI.- ból át nem vett, de bevált készítmények, pl.:

(alapanyagonként felírhatók)

Suspensio antiseborrhoica

Hydrarg. sulf. rubr. (0,5 g)
 Sulf. praecip. (5,0 g)
 Suspensio siccans (70,0 g)
 Alc. dil 70% (25,0 g)
 D.S.: Külsőleg. Éjszakára.
 Dermatologicum. Antiseborrhoicum.

Solutio antimycotica

Acid. benzoic. (0,6 g)
 Acid. salicylic. (0,6 g)
 Acid. boric. (0,6 g)
 Sol. iodi alc. (2,5 g)
 Alc. dil. 70% (ad 50,0 g)
 D.S.: Külsőleg. Ecsetelésre.
 Dermatologicum. Antimycoticum.

Solutio gastrica

Natrii dihydrogenphosph. (12,0 g)
 Acid. phosph. dil. 10% (20,0 g)
 Acid. sorbonici (0,20 g)
 Aquae dest. (ad 200,0 g)
 M. f. solutio
 D.S.: 1 evőkanálnyit fél pohár vízben elkeverve, étkezés közben bevenni.
 Digestivum. A gyomornedv kémhatásának beállítására. Hypaciditas, hyperaciditas.

Oculogutta viscosa

Natrii hydrogencarb. (0,6 g)
 Solven. visc. pro ocul. (20,0 g)
 Aquae dest. pro inj. (ad 40,0 g)
 M. f. oculogutta
 D.S.: Külsőleg. Műkönny.

Susp. bismuthi subsalicylici pro infante

Bismuthi subsalicyl. (2,0 g)
 Mucilago hydroxyethylcell. (30,0 g)
 Diluendi aromatici (1,0 g)
 Solutionis conservantis (1,0 g)
 Saccharimidi natr. [tabl. duas (II)]
 Aquae dest. (ad 100,0 g)
 M. f. suspensio
 Da ad vitrum fuscum
 D.S.: Naponta 3-5x 1 kávéskanálnyit beadni.
 Antidiarrhoicum. Adstringens. Enteroantisepticum. Enteritis, diarrhoea, postenteritises állapot, idült enteritisek.
 A székletet feketére festheti!

Carbo activatus (Tabl.)

Carbonis activati (25,0 g)
 Da ad scatulam
 D.S.: Naponta többször 1 tetézt kávéskanálnyit vízzel elkeverve bevenni.

Protalgolos orrcsepp

Argenti proteinici (0,20 g)

Aquae dest. (ad 10,0 g)

M. f. nasogutta

Da ad vitrum fuscum

D.S.: Külsőleg, orrcsepp. Naponta 3x8-10 cseppet becseppenteni.

Rhinologicum. Antisepticum. Masszív, purulens orrváladékozásban. Az orrváladékot elszínezheti.

Gyógyteák felírása

Pl.: Rp)

- Chamomillae anthodium (kamillavirág)
- Uvae ursi folium (medveszőlőlevél)
- Sennae fructus (szennatermés)
- Tilliae flos (hársfa)
- Cynosbati pseudofructus (csipkebogyó)
- Species althaeae (mályva)
- Sambuci flos (bodzavirág)

FoNo VII. fő készítményei indikációk szerint (ATC)**1. Tápcsatorna****Antacidok**

- Enyhe bázisok $\Rightarrow$ alkalózist okozhatnak
- Pl. Natrium-hydrogen-carbonát, natrium- citrát
- Al, Ca, Mg tartalmúak (gyomorsavval bázikus sót képeznek, széklettel ürülnek)
- Mg. tart. $\Rightarrow$ hashajtó
- Al. tart. $\Rightarrow$ székrekedés
- Mg, Al, Ca minimalis felszívódás, de: veseelégtelenségben veszélyes!
- Interakciók: tetracyclinek, digitalis, kumarinok, steroidok, bifoszfonátok (megkötik őket a bélrendszerben), vaskészítmények felszívódását gátolják (min. 2 óra különbséggel bevenni!)
- Bizmut sók: gyomor nyálkahártya sejtekben emelik a prostaglandin szintet, védőréteget képeznek a fekély felületén, antibakteriális hatás (HP infekció!) Székletet sötétre festik.

Pl.:

- Pulv. antacid.
- Pulv. bism. tann.

Digestivumok, savbeállítók

Pl.:

- Sol. pepsin.
 - Gyomorsavhiány, vizeletsavanyítás
 - Szívószálon inni (fogzománcot károsítja)
 - Hatóanyag: acid. chlor. dil. 10% + pepsin (enzim)

Pl.:

- Tinctura amara
- Species gastrica
- Phytotherapeuticumok

Hashajtók

- Bélmozgást fokozó, bélfalizgató, pl. szennalevél, fenolftalein
- Ozmotikus hashajtók, pl.: Na- szulfát
- Bélfalat bevonó szerek, sikamlóssá teszik a bélfalat, pl.: paraffinolaj

- Drasztikus hashajtók, pl.: ricinusolaj

Veszélyek:

- Tartósan alkalmazva bélnyálkahártya károsítók
- Zsíroldékony vitaminok!

Fogyasztószernak ne ajánljuk ezeket!

Pl.:

- Emuls. paraff. cum phenolphth.
- Magnesii sulfas heptahydricus = régi magn. sulf. (keserűsítő)
- Paraff. aromat.
- Pulv. phenolphth. comp. (Tabl.!)
- Sennae fruct.
- Ol. ricini, Emuls. ol. ricini

Hasfogók, hasmenés elleni szerek

Pulv. opii et ipec. - beszerzési problémák miatt jelenleg Ø

Görcsoldók

- Supp. papaverini pro parv.
- Supp. spasmolyth. (Extr. bellad. sicc. - beszerzési problémái) ++
- Pulv. spasmalg. ++
- De: atropinszerű hatás! (Ellenjav.: glaucoma, BPH, szoptatás, granulocytopenia, II.-III. fokú AV-block, stb.)
- Salicylát tartalmú (allergia, Reye syndroma veszélye!)

Hányáscsillapítók

- Supp. antiemet.
- Extr. bell. sicc. - beszerzési probléma
- Hányinger, csuklás csillapítására
- Belladonna és coffein hatóanyagok
- Anticholinerg hatás (ellenjav.!)

2. Ásványi sók

- Pulv. calcii lactophosph. (gravida is szedheti. csonttörés, rachitis)
- Pulv. magn. citr. 500 mg. (De: nagyobb dózisban ozm hashajtó)
- Pulv. trikal. citr.
- Pulv. magn. et calc. (Ellenjav.: vesekövesség)
- Sol. kalii iodati (Általános jódterápia. Ellenjav: allergia, hyperthyreosis, pajzsmirigy cc.)
- Sol. Lugoli (Jód oldat. Pajzsmirigyműtét előkészítésére)
- Sal ad rehydrationem (1 por 1 liter vízhez, naponta. Oralis rehidráció.) ~ pro parvul.

3. Roboráló szerek

- Oleum jecoris, emulzió jecoris comp.

Tőkehalmájból

A-, D-vitamin, esszenciális zsírsavak

Rachitis, D vitamin hiány

Veszély: hypervitaminosis (hajhullás, bőrszárazság, hasmenés, hypercalcaemia)

4. Bőrgyógyászati készítmények

- Gombás fertőzések: (immunrendszer, diabetes!), oldatok, krémek, hintőporok, megelőzésre is, Candida, fonalgombák, Pityriasis vers., intertrigo, interdigitalis mycosis, körömgomba
- Bőrszárazság, bőrápolás: hidratálás + zsírtartalom visszaadás
- Sebellátás: sebtisztítás, környezet védelme, belső kezelés
- Bőrgyulladások: égések, napégés, megelőzés
- Eczema: csecsemő, idős száraz bőrre, szteroidok tartós alkalmazása (?), szteroid igény csökkentése hígítással, hidratáló, puhító krémekkel
- Szalicyl: 1-3% hámosít, desiniciens, 3% > keratolyticus!

Gombásodás elleni szerek

- Glycerin. borax.
- Sol. Castellani sine fuchs.
- Spars. antimycoticum
- Ung. boraxatum
- Ung. boraxat. cum aqua calc.

Bőrlágyító és védőanyagok

- Collod. c. acid. salicyl. (szemölcsre!)
- Pasta contra solarem (UV védő?)
- Pasta zinci oxyd.
- Pasta zinci oxyd. salicyl. (Lassar paszta)
- Sol kalii permanganici
- Ung. ad pernionem
- Ung. camphoratum ad pernionem
- Ung. argenti nitrici (Mikulitz kenőcs)
- Ung. cholesterinatum pro infant.
- Ung. dermatophylicum
- Ung. emoll.
- Ung. glycerin.
- Ung. hydrosum
- Ung. infantum
- Ung. neonatorum
- Ung. nutritivum
- Ung. stearini

Sebek és fekélyek kezelésére

- Cremor refrig. (= régi Ung. refrig.)
- Pasta antiphlogistica
- Ung. lidocaini ad rhagades (emlőbimbó, végbélrhagadok, erosiok)

Viszketés elleni szerek

- Cremor aquosus (antiseborrhoicum, Flucinaral is)
- Cremor erythromycini (acne seborrh.)
- Detergens sulf. (hajsampon, hajás fejbőr seborrhoeája)
- Hydrogel antiphlogist. (napégés, rovarcsípés)
- Spars. refrig. (mentolos hintőpor)
- Spiritus erythromycini (acne seborrh.)
- Spir. salic. (desiniciens)
- Spir. salic. cum resorcino (antimycoticum)
- Susp. ichthyolata (rosacea, seborrhoeás dermatitis)
- Susp. zinci aquosa (cinkes rázókeverék)
- Susp. zinci oleosa
- Ung. alum acet. tart. (Burow kenőcs)
- Ung. anaesthet. (lidocainos)
- Ung. antiphlog. pro inf.
- Ung. sulfuratum et salicylatum (szaliciles-kénes kenőcs) (seborrhoeás dermatitis)

Antisepticumok és fertőtlenítők

- Alum. acet. tart. sol.
- Chamomillae anthodium
- Hydrogelum antisudoricum (hyperhydrosis)
- Hydrogenium perox. dil 3% (sebtisztítás)
- Linimentum scabidum (scabies)
- Pasta boraxata (bőr desinf. + szárítása)
- Pasta Burowi (gyulladáscsökkentő hűtőpaszta)
- Sol. acidi borici 2% (antisepticum)
- Sol. antisudorica (hyperhydrosis)
- Sol. contra rhagades mamillae
- Ung. contra rhagades mamillae
- Sol. hexachloropheni (fertőtlenít, dezodorál)
- Sol. iodi alc.
- Sol. merbromini
- Spars. antisudoricum
- Spars. hexachloroph. (antisepticus, izzadásgátló)
- Ung. hexachloroph.
- Susp. siccans
- Ung. ad vulnera (felületes bőrsérülésre)
- Ung. antisepticum
- Ung. refrigerans (régi!, kemény állagú)
- Vaselini acidi borici

Psoriasis elleni szerek

- Liquor carbonis detergens (kátrányos ecsetelő, színes)
- Pasta lithantracis (kátrányos paszta)
- Ung. Dithranoli 0,1% (gyullasztó)
- Ung. salicyl. 5% et 10% (hámlasztó)

Hámosítók

- Ung. salic 1% et 3%
- Ung. ichthyolsalic.
- Ung. jecoris
- Ung. triplex (hyperkeratosis)
- Ung. zinci oxyd.

5. Cardiovascularis rendszer

Aranyér elleni localis készítmények:

- Supp. ad nodum (efedrines)
- Supp. haemorrhoidale (efedrines)

Diureticumok:

- Spec. diur. (beszerzés?)
- Spec. uvae ursi

6. Urogenitalis rendszer

Nőgyógyászati antisepticus készítmények:

- Acid. lact. dil. (fluor)
- Globulus glycer. boraxat. (Candida colpitis)
- Ovulum metronidazoli (antibiotikumos hüvelykúp: anaerobok + trichomonas)
- Ovulum nystatini

Urológiai készítmények:

- Solutio nephrolytica (csak urátkövek oldására)

7. Reumás panaszok gyógyszerei

- Pasta antirheumatica (pakolásra)
- Ung. antirheumaticum
- Ung. contra rheumam
- Sol. antirheumatica
- Sol. sulfurata pro balneo (kénterápia)
- Spir. antirheumaticus
- Spir. capsici
- Spir. menthae cum sale (törzskönyvezve csak) (sósorszesz)

8. Idegrendszer

Helyi érzéstelenítők

- Hydrogelum anaestheticum (nyálkahártya, bőr)
- Mucilago ad catheterem (katétercsúsztató)
- Susp. anaesthet.

Fájdalomcsillapítók

- Láz- és fájdalomcsillapítás szükségessége
- Hatóanyagok: acetil-szalicilsav, paracetamol, noraminophenazon, aminofenazon.
- Kiegészítések: kodein, etilmorfin, papaverin, koffein, stb.
- Asthmás betegnek inkább paracetamol, vagy noraminophenazon alapú szert rendeljünk! (szalicilátok asthmás rohamot provokálhatnak!)
- Terhesség alatt: Organogenesis időszakában lehetőleg semmi! Utána paracetamol. Terhesség utolsó időszakában a szalicilátok gátolják a méhösszehúzódást, kerülni kell.
- Gyermekkor: Lehetőleg paracetamol. ASS vírusbetegségben Reye syndromát okozhat. Aminofenazon: agranulocytosis veszélye (ritka)
- Minor analgetikumok: fájdalomcsökkentő, gyulladásgátló, lázcsillapító
- Tartós alkalmazásának veszélyei:
 - szalicilátok: gyomorirritáció, vérzés, stb.
 - paracetamol: májkárosító
 - aminofenazon: vese- és csontvelőkárosító
- Pulvis analgeticus (aminofenazon + koffein)
- Pulv. antidolor (Tbl.)
- Pulv. Codacisali
- Pulv. Coffacyli
- Pulv. coffacyli cum codeino
- Pulv. paracetamoli cum codeino
- Supp. analg. forte (codein, koffein, aminophenazon)
- Pulv. antimigrainicus (papaverin, koffein, aminophenazon - migrén ellen!)

Láz- és fájdalomcsillapítók

- Pulv. chinacisal. cum vitamin C (Tbl.)
- Pulv. comb. (ASS, aminofenazon, koffein)
- Sol. noraminophenason. pro parv.
- Supp. antipyretic pro infant., pro parvulo (aminophenazon)
- Supp. noraminophenazoni 100 mg, 200 mg, 500 mg (Tbl: 100 mg, 200 mg)
- Supp. Paracetamoli 60 mg, 120 mg, 250 mg, 500 mg

Altató és nyugtatók

- Gutta valerianae cum menthol (jelenleg beszerzési gondok)
- Species sedativa (beszerzés ?)

Pszichostimulánsok

- Pulv. coffeini 50 mg, 100 mg (Tabl.)

9. Légzőrendszer

- „Rhinitis medicamentosa” elkerülése
- Illóolajok antisepticus hatás, de. irritáció!
- Lokális antisepticumok: klórhexidin, hexaklorofén
- Köptetők hatása:
 - Hörgőkben fokozzák a váladék elfolyósodását, kiürülését (hörgő perisztaltika, csillósőrök mozgása fokozódik)
 - Indirekt hatás: reflexes úton - gyomornyálkahártya izgatása révén
- Köhögéscsillapítók hatása:
 - Perifériás: légúti receptorok érzékenysége
 - Centralis: köhögési központ (etilmorfin)

Nasalis készítmények

- Nasogutta ephedrini 1%, 2%, pro infant.
- Nasogutta natrii chlorati, ~ pro infant. (!)
- Ung. nasale

Gégészeti készítmények

- Solutio acriflavini (gargarizáláshoz, száj- és torok fertőtlenítéséhez)
- Solutio gingivalis (fogínyecsetelő)
- Solutio metronidazoli (aphtha ecsetelésére)
- Susp. nystatini (soor oris)

Asthma ellenes szerek

- Pulvis asthmaticus (papaverin, theophyllin, noraminophenazon)
- Pulv. theophyllini comp. (aethylmorphin is)
- Sol. theophyllini
- Supp. theophyllini (20 mg, 30 mg, 40 mg, 250 mg)
- Supp. theophyllini comp. (papaverinrel)

Köhögés és meghűlés gyógyszerei

- Aetheroleum pro inhalatione (eucalyptus, fenyőmagolaj)
- Oleum pro inhalatione (kámfor, mentol, eucal.)
- Ung. cum aetheroleo pro parv. (külsőleg, mellkas bedörzsölésére)
- Elix. thymi comp.
- Inf. ipecac., ~ pro parv.
- Mixt. pector.
- Susp. terpini
- Gutt. aethylmorphini (analgeticum és antitussivum - 3x15-20 csepp)
- Species althaeae (mályva)

10. Érzékszervek

- Szemészeti készítmények tisztasági foka, cseppek, kenőcsök
- Szemborogatás technikája (kamillatea, sol. acid. boric. 2%)

Szemészeti készítmények

- Oculentum erythromycini
- Oculentum neomycini
- Oculentum neomycini cum prednisolono
- Oculogutt. atropini
- Oculogutt. homatropini
- Oculogutt. erythromycini
- Oculogutt. gentamycini
- Oculogutt. naphazolini
- Oculogutt. neomycini
- Oculogutt. rifampicini
- Oculogutta neonatorum
- Oculogutt. pilocarpini (1%, 2%)

Fülészeti készítmények

- Otogutta borica (külső hallójárat gyulladása, 2x4-5 csepp)
- Otogutta hydrogencarbonici (cerumen lágyító)
- Otogutta peroxydi (H₂O₂, gyulladáscsökkentő, bőrfelújítás)

Háziorvosok által gyakran használt egyedi magisztrálisok

[A ragozások és rövidítések szabványtól eltérhetnek.]

[Általánosan nagyon gyakran írt recepteket megjelöltem: „(Cs.Sz.Zs.)”]

Cérás hűtőkenőcs

Cerea albae (3,0 g)
Cholesterini (3,0 g)
Alum. acet. tart. sol. 1% (20,0 g)
Paraffini solidi (20,0 g)
Paraffini liquidi (ad 100,0 g)
M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg. Hűtőkenőcs.

Ind.: Dermatitis, pruritus, gyulladáscsökkentő, allergiás folyamatok stb. Nincs benne konzerválószer, ezért érzékeny bőrűeknek is jó. (Sztteroidos cérás hűtőkenőcs: ugyanez + Ung. „Flucinar” Tub. orig. No. I.)

Szaliciles hűtőkenőcs (1%-os – hámosít!)

Acid. salic. (1,0 g)
Alum. acet. tart. sol. 1% (20,0 g)
Vasellini cholest. (ad 100,0 g)
M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg.

Ind.: Gyulladáscsökkentő, hámosító, enyhén antimicrobás. Ulcus cruris. Égés.

Hűtőpaszta

Alum. acet. tart. sol. 1% (20,0 g)
Zinci oxyd. (15,0 g)
Talci (15,0 g)
Vasellini cholest. (ad 100,0 g)
M. f. pasta

D.S.: Külsőleg. Hűtőpaszta.

Ind.: Pl. fekély köré védelemnek.

Lidocainos hűtőpaszta

Lidocaini (10,0 g)
Past. Burowi (200,0 g)
M. f. pasta
D.S.: Külsőleg.

Hármas kenőcs

Sulf. praecip. (5,0 g)
Natr. tetraboric. (5,0 g)
Acid. salic. (3,0 g)
Vasellini cholest. (ad 100,0 g)
M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg.

Ind.: Antimicrobás. Bőrfertőzések. Ulcus cruris. Felülfertőződött eczema - steroiddal kombinálható. Scabies, interdigitalis mycosis.

Négyes kenőcs

Sulf. praecip. (5,0 g)
Natrii tetraborici (5,0 g)
Acid. salic. (3,0 g)

Clioquinoli (3,0 g)
 Vasel. cholest. (ad 100,0 g)
 M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg.

Ind.: Antimicrobás. Bőrfertőzések. Ulcus cruris. Felülfertőződött eczema - steroiddal kombinálható. Scabies, interdigitalis mycosis.

Hármas por

Sulf. praecip. (5,0 g)
 Natr. tetrabor. (5,0 g)
 Acid. salic. (1,0 g)
 Zinc. oxyd.
 Talci (aa ad 100,0 g)

M. f. sparsorium

D.S.: Külsőleg.

Ind.: Antimycoticus, szárító. Sebhintőpor. Ulcusra is.

Szalicil-kénes hydrophil kenőcs

Sulf. praecip. (6,0 g)
 Acid. salic. (5,0 g)
 Ung. hydrophil. anionic. (ad 100,0 g)
 M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg. Kenőcs a fejbőrre.

Ind.: Seborrhoeas hajas fejbőrre. Hajas fejbőr psoriasisos gócaira – Diprosalic kenőccsel kombinálni lehet.

Kézkenőcs (Cs. Sz. Zs.)

Ung. hydrophil. non-ion. (100,0 g)
 Ung. stearini (50,0 g)
 Aquae dest. (50,0 g)

M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg.

(Eczema esetén szteroid kenőccsel kombinálható)

Csípésre

Ung. „Elocom” [Tub. orig. No. I. (unam)]
 Pastae Burowi FoNo [ad gta. 50,0 (quingenta)]
 Misce fiat pasta
 D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.

Kiütésre

I.
 Ung. „Elocom” [Tub. No. II. (duas)]
 Cremoris refrig. FoNo [ad gta. 100,0 (centum)]
 M. f. unguentum
 D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.

II.
 Susp. zinci aquosae
 Dosim No. I. (unam)
 D.S.: Külsőleg. Rázókeverék.

Mosakodáshoz száraz bőr vagy eczema esetén

I.
 Ung. hydrophil. non-ion. FoNo
 gta. 100,0 seu 200,0 (centum seu ducenta)
 D.S.: Külsőleg. Mosdókenőcs.

II.
 Unguenti emulsificantis non-ionici
 gta. 100,0 seu 200,0 (centum seu ducenta)
 D.S.: Külsőleg. Mosdókenőcs.

III.
 Ung. stearini FoNo

gta. quadringenti (400,0 g)
D.S.: Külsőleg. Fürdőkenőcs.

Oralis soor-ra

Glycerini boraxati FoNo
Dosim No. I. (unam)
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Borax glicerines szájöblögető.

Aphtára

I.
Argenti nitrici (gma. 1,0)
Aquae destillatae [ad gta. 100,0 (centum)]
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Ecsetelő.

II.
Nystatini (0,5 g)
Glyc. borax. FoNo [(Dos. No. I.(unam)]
M. fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Ecsetelő.

Eleosaccharum anaestheticum (régi név) (jó)

Saccharosi (4,0 g)
Aetherol. menthae (gutt. I.)
Aetherol. thymi (gutt. I.)
Benzocaini (0,4 g)
Natrii tetraborici (0,4 g)
Divide in doses aequal. No. X. (decem)
D.S.: Naponta 3-5x 1 port szárazon, víz nélkül elszopogatni.
Fájdalomcsillapító por, benzocainos. Fájdalmas szájsebekre.
(Pl. tele aphthával a gyermek szája. Ez esetben antimycoticum szükséges lehet hozzá.)

Fekélyre, ill. sebek tisztítására

I.
Hydrogenii peroxydati diluti 3% FoNo
Dosim No. I. (unam)
D.S.: Külsőleg. Fertőtlenítő oldat.

II.
Sol. merbromini FoNo
Dosim No. I. (unam)
D.S.: Külsőleg.

Égésre *

Ung. „Betadine”
Tub. orig. No. II. (duas)
Acidi salycilici
gma. 1,0 (unam)
Aluminii acetici tartarici sol. 1%
gta. 20,0 (viginti)
Vasellini cholesterinati
ad gta. 100,0 (centum)
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Hűtőkenőcs.
* Vigyázat! Szalicil érzékenyeknek tilos!

Bőr zsírozására

Cerea albae
Cholesterinati aa gta. (3,0)
Aluminii acetici tartarici soluti 1%
Paraffini solidi aa gta. (20,0)
Paraffini liquidi [ad gta. 100,0 (centum)]
Misce fiat unguentum

D.S.: Külsőleg. Cérás hűtőkenőcs.

Bőrfertőzésre

Ung. "Hydrocortison 2,5%"
Tub. orig. No. II. (duas)
Ung. boraxati FoNo
ad gta. 100,0 (centum)
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.

Pörkkel fedett basaliomákra, solaris keratosisra (pörkoldó hatású)

Ung. ad vulnera FoNo
gta. 50,0 (quinguaginta)
D.S.: Külsőleg.

Antimikróbás hintőpor

Acidi tannici
gma. 1,0 (unam)
Zinci oxydati
Talci
aa. ad gta. 100,0 (centum)
Misce fiat sparsorium
D.S.: Külsőleg.

Mentolos hintőpor (FoNo VII. már tartalmazza: Spars. refrig.)

Mentholi	(1,0 g)
Zinc. oxyd.	(50,0 g)
Talci	(50,0 g)
M. fiat pulvis	

D.S.: Külsőleg.

Szteroidos cérás hűtőkenőcs

Ung. „Hydrocortison 2,5%”	(20,0 g)
seu Ung. „Flucinar”	(Tub. orig No. II.)
Cerae albae	(3,0 g)
Cholesterini	(3,0 g)
Al. acet. tart. sol. 1%	(20,0 g)
Paraffini sol.	(20,0 g)
Paraffini liqui.	(ad gta. 100,0)
M. f. unguentum	

D.S.: Külsőleg. Szteroidos hűtőkenőcs.

Ind.: lábszárfekély - necroticus szövetek oldására, dermatitis, contact dermatitis, pemphigus, pemphigoid.

Szteroidos hűtőkenőcs I.

Ung. „Ftorocort”	(Tub. orig. No. II.)
Alum. acet. tart. sol.	(10,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion.	(ad gta. 100,0)
M. f. unguentum	

D.S.: Külsőleg.

Szteroidos hűtőkenőcs II. (Cs.Sz.Zs.)

Ung. „Ftorocort (seu Flucinar)”	[Tub. No. I. (unam)]
Cremor refrig.	(30,0 g)
M. f. unguentum	

D.S.: Külsőleg.

Klionos - szteroidos hűtő arcra (Cs.Sz.Zs.)

Metronidazoli	(1,0 g)
Sol. „Nasivin”	(5,0 ml)
Cream „Locoid”	(Scat. orig No. I.)
Cremor refrig FoNo	(100,0 g)

M. f. cremor
D.S.: Külsőleg. Arcra.

Neomycines - szteroidos kenőcs arcra (Cs.Sz.Zs.)

Cream „Laticort” (Tub. No. II.)
Ung. „Ftorocort” (Tub. No. II.)
Ung. „Alksebor” (Tub. No. II.)
Pulv. Neomycini (1,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (ad gta. 200,0)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Arcra.

Szalicil - kén- bórsav kenőcs

Sulf. praecip. (6,0 g)
Acid. boric. (6,0 g)
Acid. salic. (3,0 g)
Vasel. cholest. (100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

Flucinar - vaselin (pruritus, eczema) (Cs.Sz.Zs.)

Ung. „Flucinar” (Tub. No. I.)
Vaselini albi (100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

Neomycin – vulnera (Fekélyek, sebek kezelésére fertőtlenítő oldat után) (Cs.Sz.Zs.)

Pulv. Neomycini (0,5 g)
Ung. ad vulnera (FoNo dos. No. II.)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

Fájdalomcsillapító - hűtőkenőcs (Cs.Sz.Zs.)

Ung. anaesthet. FoNo (dos. No. III.)
Cremoris refig. FoNo (dos. No. III.)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

Csodakenőcs (mindenre...) (Cs.Sz.Zs.)

Ung. „Flucinar” (Tub. No. I.)
Cream „Nizoral” (Tub. No. I.)
Neomycini (1,0 g)
Ung. alum. acet. (50,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

Neomycines kenőcs (sebre, lábszárfekélyre)

Neomycini (1,0 g)
Cerae lanae (10,0 g)
Vaselini albi (100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

Ulcus crurisra, ha szükséges az erős, szteroidos kenőcs... (Cs.Sz.Zs.)

Neomycini sulf. (1,0 g)
Mentholi (1,0 g)
Ung. „Canesten” (Tub. No. I.)
Ung. „Flucinar N” (Tub. No. I.)
Vaselini cholest. (30,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

Sampon korpásodásra (Cs.Sz.Zs.)

Cream „Nizoral” (Tub. No. I.)
 Detergens sulf. FoNo (dos. No. I.)
 M. f. suspensio
 D.S.: Külsőleg. Sampon.

Heparinos visszérkenőcs

Inj. „Heparibene-Na” (Amp. No. I.)
 Ung. hydr. non-ion. (250,0 g)
 M. f. unguentum
 D.S.: Külsőleg. Visszérkenőcs.

Visszérkrém (Cs.Sz.Zs.)

Inj. „Heparibene 25000 E” (Amp. orig. No. I.)
 Acidi salicylic. (2,0 g)
 Methylsalicylici (0,1 g)
 Neomycin. sulfur. (0,5 g)
 Aetherolei menthae (10,0 g)
 Ung. hydrophil. non-ion. (86,4 g)
 M. f. unguentum
 D.S.: Külsőleg. Visszérkrém.

Postthromboticus sy. - fájdalmas vénák

Inj. „Venoruton” (Amp. orig. No. V.)
 Inj. „Heparin” (Amp. orig. No. I.)
 Ung. „Ftorocort” (Tub. orig. No. II.)
 Ung. hydrophil. non-ion. (ad gta. 100,0)
 M. fiat unguentum
 D.S.: Külsőleg.

Indometacinos kenőcs (Cs.Sz.Zs.)

Indometacini (2,0 g)
 Camphori (2,0 g)
 Mentholi (1,0 g)
 Tinct. capsici (3,0 g)
 Hydrogel methylcellulosi (40,0 g)
 Ung. hydrophil. non-ion. (ad 100,0 g)
 M. fiat unguentum
 D.S.: Külsőleg.

Aranyércúp (Cs.Sz.Zs.)

Inj. „Tonogen 1 ml.” (Amp. No. I.) [korábban külön vényre kellett írni]
 Inj. „Di-Adreson F Aquosum 25 mg” (Amp. No. II.)
 Benzocaini (10,0 g)
 Bals. peruviani (4,0 g)
 Butiri cacao (90,0 g)
 M. f. suppositorium
 Divide in doses aequ. No. XXX. (triginta)
 D.S.: Végbélkúp. Naponta 1x1.

Lábizzadás elleni hintőpor

Acidi salicyl. (2,0 g)
 Acid. tannici (2,0 g)
 Zinci oxyd.
 Talci (aa. ad gta. 100,0 g)
 M. f. sparsorium
 D.S.: Külsőleg.

Bőrkeményedésre kenőcs

Ung. „Diprosalic.” (Scat. orig. No. I.)
 Acid. salic. (6,0 g)

Cremoris aquosus (FoNo dos. No. II.)
 M. fiat unguentum
 D.S.: Külsőleg.

Sarokpuhító kenőcs

Alcoholi cetylstearyl (6,0 g)
 Cerae lanae (6,0 g)
 Cerae albae (6,0 g)
 Cetacei (6,0 g)
 Paraffini liquidii (55,0 g)
 Natrii tetraborici (0,6 g)
 Aquae dest. (20,4 g)
 M. fiat unguentum
 D.S.: Külsőleg.

Talpra, sarokra bőrpuhító, keratolyticum

Carbamidi (10,0 g)
 Alum. acet. tart. sol. (10,0 g)
 Vaselini cholest. (ad 100,0 g)
 M. fiat unguentum
 D.S.: Külsőleg. Talpra, sarokra.
 (Ha gombás: + „Canesten”. Ha nagyon vastag a bőr: + „Lorinden-A”)

Seb környékére: olajos rázókeverék

Ung. „Flucinar” (Tub. orig. No. II.)
 Susp. zinci oleosa FoNo (ad gta. 100,0)
 M. f. suspensio
 D.S.: Külsőleg. Fekély környékére.

Korpás felrakódásra

Acid. salic. (3,0 g)
 Sulf. praecip. (6,0 g)
 Ung. hydrophil. non-ion. (ad 100,0 g)
 M. fiat unguentum
 D.S.: Külsőleg.

Korpás hajra hajszesz

Naphtholi-B (1,0 g)
 Acid. salicyl. (3,0 g)
 Tinct. capsici (5,0 g)
 Alc. dil. 70% (ad 100,0 g)
 M. fiat solutio
 D.S.: Külsőleg. Hajszesz.

Serkentő hajszesz

Naphtholi-B (1,0 g)
 Tinct. capsici (3,0 g)
 Alc. dil. 70% (ad 100,0 g)
 M. fiat solutio
 D.S.: Külsőleg. Hajszesz.

Hajszesz (hajhullásra)

Tabl. „Loniten 5 mg” [No. XX. (viginti)]
 Tinct. capsici (10,0 g)
 Inj. „Panthenol” [(Amp. No. V.(quinque)]
 Spir. salic. (180,0 g)
 M. fiat solutio
 D.S.: Külsőleg. Hajszesz.

Canesten popsikenőcs

Natrii tetraborici (2,0 g)

Glycerini	(6,0 g)
Olei jecor.	(20,0 g)
Ung. „Canesten”	(Tub. No. I.)
Zinci oxyd.	(10,0 g)
Talci	(10,0 g)
Alum. acet. tart. sol.	(10,0 g)
Vaselini cholest.	(100,0 g)
M. fiat unguentum	
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.	

Heller féle popsikenőcs

Acidi borici	(4,0 g)
Paraff. solid.	(6,0 g)
Cerae albae	(6,0 g)
Glycerini	(20,0 g)
Ol. helianthi	(64,0 g)
M. fiat unguentum	
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.	

Testápoló (Cs.Sz.Zs.)

Olei helianthi	(10,0 g)
Glycerini	(10,0 g)
Cerae lanae	(10,0 g)
Ung. hydr. non-ion.	(100,0 g)
Aquae dest.	(100,0 g)
Triaethanolamini	(1,0 g)
M. f. suspensio	
D.S.: Külsőleg. Testápoló.	
(Tehető még bele pl. acid. boric. 4,0 g, vagy aetherol. levend. gtt. V., vagy aetherol. citri. gtt. V.)	

Folyékony szappan vagy sampon (allergiásoknak)

Natr. laurylsulf.	(50,0 g)
Glycerini	(200,0 g)
Misce fiat suspensio	
D.S.: Külsőleg. Folyékony szappan seu sampon.	

Arcra krém

Glycerini	(15,0 g)
Aquae dest.	(15,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion.	(50,0 g)
M. f. cremor	
D.S.: Külsőleg. Arckrém.	

Boraxos babykenőcs (kórházi kenőcs) (Cs.Sz.Zs.)

Natr. tetrabor.	(2,0 g)
Cerae lanae	(30,0 g)
Vaselini albi	(30,0 g)
Aquae dest.	(30,0 g)
M. fiat unguentum	
D.S.: Külsőleg. Babykenőcs.	

Kézkenőcs

Aquae dest.	(25,0 g)
Glycerini	(25,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion.	(50,0 g)
Aetherolei citrici	(0,5 g)
M. fiat unguentum	
D.S.: Külsőleg. Kézkenőcs.	

Körömgomba ecsetelő (Cs.Sz.Zs.)

Thymoli	(2,0 g)
Chloroformii	(50,0 g)

M. f. solutio
 D.S.: Külsőleg. Körömcsetelésre.
 (Fellazítja a körömöt. Csak a körömré, a bőrre maró hatású!)

Klionos ecsetelő (Aphtha)

Metronidasoli (0,75g) [Tbl. Klion No. III.]
 Lidocaini (0,10g)
 Glycerini (30,0 g)
 M. f. solutio
 D.S.: Külsőleg. Ecsetelő.

Verruca vulg. 1.

Acidi salicyl.
 Acidi lactici
 Acidi borici
 Resorcini
 Sulf. praecip.
 Carbamidi (aa. gta. 5,0)
 Glycerini (10,0 g)
 Aquae calcis (ad gta. 100,0)
 M. f. suspensio
 D.S.: Külsőleg. Használat előtt felrázandó.

Verruca vulg. 2.

Chloralhydrati (0,5 g)
 Acidi acet. concentr. (0,5 g)
 Acidi salicyl. (2,0 g)
 Aetheri (2,0 g)
 Colloidi (ad 10,0 g)
 M. f. solutio
 D.S.: Külsőleg. Ecsetelő. Szemölcsökre.

Popsikenőcs

Natr. tetrabor. (2,0 g)
 Olei jecor. (5,0 g)
 Zinc. oxyd. (5,0 g)
 Cerae lanae
 Glycerini
 Vasel. flavi (aa. ad 100,0 g)
 M. fiat unguentum
 D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.

Kézkenőcs II.

Ung. stearini (80,0 g)
 Ung. hydros. (20,0 g)
 Olei Vitamini „A” (0,5 g)
 Aetherol. citrici [gutt. X. (decem)]
 M. fiat unguentum
 D.S.: Külsőleg. Kézkenőcs.

45-ös kézkenőcs

Ung. glycerini (20,0 g)
 Ung. hydrophil. non-ion. (20,0 g)
 Ung. hydrosi (20,0 g)
 Ung. stearini (40,0 g)
 Aetherol. citrici (1,0 g)
 M. fiat unguentum
 D.S.: Külsőleg. Kézkenőcs.

Arcszesz

Sol. „Laticort” (20,0 ml.)
 Metronidazoli (10,0 g)

Acid. salic. (2,0 g)
 Alcoholi dil. 70% (90,0 g)
 Aquae dest. (70,0 g)
 M. fiat solutio
 D.S.: Külsőleg. Arcszesz.

Arctej

Pulv. acid. boric. (3,0 g)
 Ung. hydr. non-ion. (40,0 g)
 Aquae dest. (200,0 g)
 M. fiat cremor
 D.S.: Külsőleg. Arctej.

Édesítőpor (Cs.Sz.Zs.)

Sorbiti (995,0 g)
 Saccharimidi natrii (5,0 g)
 Misce fiat pulvis
 D.S.: Édesítőpor.

Cs. Szabó féle por (lábikragörcsre)

Trikalii citrici (0,5 g)
 Magnesii citrici (0,5 g)
 Misce fiat pulvis.
 Dentur tales doses No XXX (triginta)
 D.S.: Este 1 por. Lábikragörcsre.

Morfinos kúp

Morphyni hydrochlor. (0,02 g)
 Vehiculi
 Quantum satis misce fiat supp.
 Dentur tales doses No. XXX. (triginta)
 D.S.: Naponta 3x1 kúpot a végbélbe helyezni.

Ávéd féle kanalas

Natrii salicylici (2,0 g)
 Codeini hydrochlorici (0,10 g)
 Ephedrini hydrochlorici (0,10 g)
 Tinct. saponariae (gutt. IV.)
 Elix. thymi (50,0 g)
 Sol. cons. (1,0 g)
 Aquae dest. (50,0 g)
 Misce fiat solutio
 D.S.: 3x1 evőkanállal.
 Baktériumfertőzésnél, antibiotikum mellé.
 Vírusfertőzésnél salicylatot ne!

Benczédi - köptető (Cs.Sz.Zs.)

Codeini hydrochlor. (0,4 g)
 Ephedrini hydrochlor. (0,4 g)
 Sir. kalii sulfoguaiajcoli (300,0 g)
 Misce fiat solutio
 D.S.: 3x1 evőkanállal.
 (Extr. bell. sicc. hiánya miatt, Sir. kalii sulfoguaiajcoli helyett Elix. thymi comp. is lehet.)

Benczédi - por (gyomorsavkötő)

Phenobarbitali (0,20 g)
 Extr. bell. sicc. (0,20 g)
 Natr. hydrogencarb. (100,0 g)
 M. f. pulvis
 D.S.: Este egy evőkanállal.
 [Jelenleg extr. bell. sicc. hiánycikk]

Kakasszéki antiflogisztikus pakolás (Cs.Sz.Zs.)

Bolus albae	(142,0 g)
Acidi borici	(1,2 g)
Glycerini	(152,0 g)
Sol. iodi alc.	(0,8 g)
Aetherol. eucalipt.	(0,2 g)
Aetherol. menth.	(0,2 g)
Acid. salic.	(0,2 g)
Methyl. sal.	(0,4 g)
Alcoholi 96%	(1,6 g)
Aquae dest.	(0,9 g)

Misce fiat unguentum

D.S.: Külsőleg. 24-48 óráig az ízületen tartani, párakötés formájában.

Megjegyzés: csak subacut vagy chronicus gyulladás esetén használjuk.

(Acut ízületi gyulladásnál kezdeti rosszabbodást okoz.)

Thiaminos kenőcs

Thiaminii chlor.	(1,0 g)
Lidocaini	(2,0 g)
Mentholi	(2,0 g)
Noraminophenasoni	(5,0 g)
Aetherol. menthae pip.	(3,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion.	(80,0 g)

Misce fiat unguentum

D.S.: Külsőleg. B1 vitaminos kenőcs, reumás fájdalomra.

Lidocainos kenőcs ízületre (Cs.Sz.Zs.)

Natr. fluorati	(0,4 g)
Lidocaini	(40,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion.	(400,0 g)

Misce fiat unguentum

D.S.: Külsőleg.

Almagel 1.

Alum. hydroxid.	(4,0 g)
Magn. oxyd.	(1,38 g)
Sorbiti	(16,0 g)
Sol. cons.	(1,0 g)
Vanillini	(0,004 g)
Muc. metylcell.	(30,0 g)
Aquae dest.	(ad 100,0 g)

Misce fiat suspensio

D.S.: 3x1 ek.

Almagel 2.

Alum. hydroxid.	(6,80 g)
Magn. carb. hydr.	(2,35 g)
Sorbiti	(27,20 g)
Aquae dest.	(ad 170,0 g)

Misce fiat suspensio

D.S.: 3x1 ek.

[**Almagel A:** + Benzocaini (3,40 g)]

Gyomorsav megkötő por

Calcii carbon. pp.	(50,0 g)
Magnes. trisilic.	(50,0 g)
Natr. hydrogencarb.	(50,0 g)

Misce fiat pulvis

D.S.: Naponta 3x1 csapott teáskanálnyit 2 ujjnyi vízzel elkeverve étkezés közben bevenni.

Alkalikus porkeverék

Magnes. oxydati	(5,0 g)
Natr. hydrogencarb.	(95,0 g)

Misce fiat pulvis

D.S.: naponta 3x1 késhegynyiit kevés vízzel, étkezés után bevenni.

Ind.: Antacidum

Lejárat: 6 hónap

Gyomorsavlekötő gél

Magnes. trisilic. (25,0 g)

Sorbiti (10,0 g)

Aquae dest. (40,0 g)

Sol. cons. (2,0 g)

Hydrogel. metylcell. (50,0 g)

M. f. suspensio

D.S.: Naponta 3x1 kávéskanállal, étkezés előtt.

Ind.: Antacidum. Ulcus. Acut és chr. gastritis.

Gyomorsavlekötő és gyomornyálkahártya bevonó susp.

Alum. hydroxyd. colloid. (8,0 g)

Magnes. oxydati (2,8 g)

Hydrogel. metylcell. (60,0 g)

Aetherolei citrici (gtt. IV.)

Sorbiti (20,0 g)

Sol. cons. (2,0 g)

Aquae dest. (ad 200,0 g)

M. f. suspensio

D.S.: Szükség esetén 1-2 kávéskanállal bevenni.

Jav: Antacidum. Gyomornyálkahártya bevonására.

Lejárat: 1 hónap

Norcainnal: + Benzocainum (4,0 g) [Almagel-A pótlására]

Bizmut-por (Helicobacter pylori infectio kiegészítő kezeléséhez)

Extr. bell. sicc. (0,02 g)

Bismuthi subsalicyl. (0,30 g)

Aluminii hydroxydati (0,50 g)

Magnesii trisilic. (0,30 g)

M. f. pulvis

Dent. tales doses No. C. (centum)

D.S.: 3x1

(Jelenleg Extr. bell. sicc. beszerzési problémái!)

Epehajtó cseppek

Tinct. chelidonii comp. (100,0 g)

Aetherol. menthae pip. (1,0 g)

Aetherol. pini sylvestr. (1,0 g)

Mentholi (1,0 g)

„Polysorbátum 20” (1,0 g)

M. f. solutio

D.S.: 3x10-20 cseppet kevés vízben, étkezés előtt bevenni.

Ind.: Cholangolum.

Lejárat: 1 hónap

Neomycines orrcsepp (Cs.Sz.Zs.)

Neomycini sulfurici (0,05 g)

Ephedrini chlorati (0,05 g)

Solvens viscosae (ad 10,0 g)

M. f. solutio

D.S.: Orrcsepp. Napi 3-5x1-1 csepp.

Orrcsepp gyermekeknek (Cs.Sz.Zs.)

Otogutta neomycini (FoNo dos. No. I.)

Inj. Hydrocortison (Amp. No. I.)

Nasogutt. ephedr. pro infant. (dosim No. I.)

M. f. solutio

D.S.: Orrcsepp. Napi 3x1-1 csepp.

Naphasolinos szemcsepp

Sol. Naphasolini (dosim No. I.)
 Sol. acidi borici (10,0 g)
 M. f. solutio
 D.S.: Szemcsepp.

Mentolos orrcsepp

Mentholi (0,10 g)
 Olei paraffini (20,0 g)
 M. f. solutio
 D.S.: Orrcsepp.

Fogamzásgátló hüvelygolyó

Phenyl. hydrargiri borici (gta. 0,01)
 Acidi tartarici (gta. 0,5)
 Acidi borici (gta. 1,0)
 Chininiumi sulfurici (gta. 1,0)
 Butyri cacao quantum satis
 Divide in doses equales No. X. (decem)
 D.S.: Külsőleg. Hüvelygolyó. Alkalmanként 1 golyó. Aktus előtt 10-15 perccel kell helyezni.

Egyéb hasznos tanácsok tőlem:

Ui.: Úgy is nagyon hatásos, ha aktus helyett használja a hölgy.

Ebben az esetben a férfi is használhatja bátran, ha van hova dugnia.

Theophyllines kanalas (Cs.Sz.Zs.)

Theophyllini (1,0 g)
 Barbitali natrii (1,0 g)
 Codeini chlorati (0,5 g)
 Ephedrini chlorati (0,5 g)
 Aquae dest. (10,0 g)
 Alc. dil. 70% (10,0 g)
 Sir. kalii sulfogujacoli seu Elix. thymi comp. (400,0 g)
 M. f. solutio
 D.S.: 2-3x1 ek.

Fejfájás por - Codeines (Cs.Sz.Zs.)

Aminophenazoni (0,1 g)
 Coffeini puri (0,1 g)
 Phenobarbitali (0,02 g)
 Codeini hydrochlorici (0,02 g)
 Papaverini hydrochlorici (0,03 g)
 Saccharosi (0,2 g)
 M. f. pulvis
 Dent. tales doses No. XXX. (triginta)
 D.S.: Fejfájásra. Szükség esetén 1x1.

Neogranormonos popsikenőcs

Acid. borici (4,0 g)
 Cerae lanae (60,0 g)
 Vasel. cholest. (60,0 g)
 Aquae dest. (60,0 g)
 Ung. „Neogranormon” [Tub. No. II. (duas)]
 M. f. unguentum
 D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.

Fájdalomcsillapító kenőcs aranyérre

Ung. „Lidocain” Scat. orig. No. I.
 Ung. „Phlogosam” Scat. orig. No. I.
 Cremoris refrig. ad gta centum (100,0 g)
 M. f. unguentum
 D.S.: Külsőleg. Aranyér kenőcs.

Psoriasisos plakkokra (erős hatású, hámlasztó+gyulladáscsökkentő)

Ung. „Flucinar”	(Tub. No. III.)
Ung. „Ftorocort”	(Tub. No. III.)
Acid. salic.	(15,0 g)
Ung. alum. acet. tart.	(95,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg.	

Fogkrém 1.

Aetherol. menthae pip.	(3,0 g)
Calc. carbon.	(30,0 g)
Magn. carbon. hydrox.	(60,0 g)
Zinc. sulf.	(0,05 g)
Natr. laurylsulf.	(10,0 g)
Tabl. saccharin	(No. I.)
Natr. fluorox.	(0,01 g)
Glycerini	(50,0 g)
M. f. pasta	
D.S.: Fogkrém.	

Fogkrém 2.

Tabl. Sacharimidi Na.	(No. V.)
Mentholi	(1,5 g)
Natr. laurylsulf.	(6,0 g)
Glycerini	(45,0 g)
Calc. carb.	(90,0 g)
Aetherol. caryophylli	(gutt. I.)
Aetherol. anisi	(gutt. V.)
Aetherol. menthae pip.	(gutt. XV.)
M. f. pasta	
D.S.: Fogkrém.	

Fogpor

Natrii hydrogencarb.	(12,0 g)
Magnesi carb. hydrox.	(12,0 g)
Calcii carb.	(90,0 g)
Natrii laurylsulf.	(6,0 g)
Mentholi	(0,6 g)
M. f. pulvis	
D.S.: Fogpor.	

Ecsetelő bőrgombásodás ellen (jódos)

Acid. salicyl.	(0,40 g)
Acid. bor.	(0,40 g)
Kal. iod.	(0,60 g)
Iodi	(0,40 g)
Natr. tetrabor.	(0,60 g)
Tinct. benzoic.	(40,0 g)
M. f. solutio	
D.S.: Külsőleg.	

Papaverines por

Phenobarb. Na.	(0,20 g)
Papaverini chlor.	(0,10 g)
Saccharosi	(10,0 g)
M. f. pulvis	
D.S.: Sz. e. 1x1 por.	

Bőrn nyugtató kenőcs

Acid. salicyl.	(0,15 g)
Sulf. praecip.	(1,0 g)
Talci	(1,0 g)
Ung. „Ftorocort”	(15,0 g)

Ung. hydrophil. nonion. (30,0 g)
 M. f. unguentum
 D.S.: Külsőleg.

Kézkenőcs 5.

Glycerini (10,0 g)
 Aquae dest. (20,0 g)
 Cerae lanae (40,0 g)
 Ung. emoll. (30,0 g)
 M. f. unguentum
 D.S.: külsőleg.

Ecsetelő bőrgombásodás ellen

Acid. salic. (0,60 g)
 Acid. boric. (0,60 g)
 Sol. iod. spir. (4,00 g)
 Spir. camph. (20,0 g)
 M. f. solutio
 D.S.: Külsőleg.

Andrews gyógyzó (113 g) (másnaposság ellen)

Saccharosi	(45,76 g)	[40,5%]
Natr. hydrogencarb.	(25,54 g)	[22,6%]
Acid. citr.	(22,04 g)	[19,5%]
Magn. sulf.	(19,66 g)	[17,4%]
M. f. pulvis		

D.S.: Felnőtteknek savkötőként 1 csapott tk. port 1 pohár vízben feloldani, pezsgés közben meginni.

Max. napi dózis 4x1.

Hashajtóként 2 csapott tk.-nyit 1 pohár vízben feloldani, pezsgés közben meginni, reggeli előtt vagy lefekvéskor.
 Gyerekeknek 6-10 éves korig a felnőtt adagok fele adható.

Megfázás elleni tea gyerekeknek

Salicis cortex (40,0 g)
 Tiliae flos (40,0 g)
 Chamomillae anthod. (10,0 g)
 Aurantii pericarpium (10,0 g)
 M.D.S.: Teakeverék.

Izzasztó tea gyerekeknek

Tiliae flos (40,0 g)
 Sambuci flos (30,0 g)
 Menthae piperitae folii (15,0 g)
 Aurantii pericarpium (10,0 g)
 M.D.S.: Teakeverék.

1 ek. teakeveréket 150 ml. forró vízzel leforrázni, 10 percig fedve hagyni, majd leszűrni.

RITEX pakolás (izomlazító)

Aetheri (62,0 g)
 Chloroformi (25,0 g)
 Camphori (1,80 g)
 Methylsalic. (0,60 g)
 Acid. acet. cc. (0,60 g)
 Alcoholic 96% (58,5 g)
 M. f. solutio

D.S.: Külsőleg. Ritex pakolás. Fél óráig tartani a kezelt felületen

Megjegyzés: Gyúlékony oldat. Érdemes vazelint írni mellé, azt fóliára kenni, rovátkolni, arra cseppenteni a folyadékot.

Reumatej

Acid. acetylsalic. (16,0 g)
 Lidocaini (6,0 g)
 Mentholi (2,0 g)

Camphori	(2,0 g)
Methyl. salic.	(4,0 g)
Tinct. caps.	(0,6 g)
Alc. 96%	(40,0 g)
Aquae dest.	(100,0 g)
Methylcellulosi	(6,0 g)
Polysorbati 20	(0,4 g)
M. f. suspensio	
D.S.: Külsőleg.	

Pórusösszehúzó krém

Camphori	(1,0 g)
Alum. acet. tart. sol.	(5,0 g)
Ung. zinc. oxyd.	(14,0 g)
Ung. hydrophil. non-ionici	(30,0 g)
(utóbbi kettőben oldani a camphort)	
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg.	

Popsikenőcs 1.

Acid. borici	(1,5 g)
Zinc. oxyd.	(2,5 g)
Lanolini	(5,0 g)
Vasel. flavi	(50,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.	

Popsikenőcs 2.

Ung. „Azulenol”	(20,0 g)
Ung. boraxat.	(80,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.	

Popsikenőcs 3.

Zinc. oxyd.	(20,0 g)
Talci	(20,0 g)
Natr. bor.	(2,0 g)
Ol. jecoris	(20,0 g)
Cerae lanae	(100,0 g)
Ol. helianthi	(100,0 g)
Alum. acet. tart. sol. 1%	(20,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.	

Popsikenőcs 4.

Natr. tetrabor.	(4,0 g)
Cerae albae	(6,0 g)
Paraff. solid.	(6,0 g)
Glycerini	(20,0 g)
Ol. helianthi	(ad 100,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.	

Popsikenőcs 5.

Sol. acid. bor.	(20,0 g)
Cerae lanae	(20,0 g)
Cerae albae	(6,0 g)
Ol. helianthi	(30,0 g)
Zinc. oxyd.	(30,0 g)
Talci	(30,0 g)
Ung. Neogranormon	(60,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.	

Popsikenőcs 6.

Cerae albae	(45,0 g)
Paraff. solid.	(45,0 g)
Alum. acet. tart. sol.	(50,0 g)
Ol. helianthi	(315,0 g)
Natr. tetrabor.	(15,0 g)
Aquae dest.	(30,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.	

Pattanásos bőrre

Resorcini	(4,0 g)
Pasta zinci oxyd.	(4,0 g)
Ammonii bitumensulf.	(10,0 g)
Vasel. flav.	(10,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg.	

Pilling (bőrradírt)

Ung. simpl.	(10,0 g)
Alc. dil. 70%	(20,0 g)
Zinc. oxyd.	(10,0 g)
Talci	(10,0 g)
Acid. lact.	(10,0 g)
Glucosi	(5,0 g)
Acid. salic.	(1,0 g)
Hydrogel. metylcell.	(100,0 g)
M. f. pasta	
D.S.: Külsőleg. Bőrradírt.	

Nivea krém

Cerae albae	(8,0 g)
Paraff. solid.	(7,0 g)
Cholesterini	(1,5 g)
Paraff. liquid.	(5,0 g)
Lanolini	(7,5 g)
Vasel. albi	(80,0 g)
Aquae dest.	(80,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg.	

Napolaj 1.

Cerae lanae	(20,0 g)
Butyri cacao	(20,0 g)
Aquae dest.	(30,0 g)
Paraff. liquid.	(ad 200,0 g)
Misce fiat suspensio	
D.S.: Külsőleg. Napolaj.	

Napolaj 2.

Cerae lanae	(20,0 g)
Ung. Azulenol	(20,0 g)
Butyri cacao	(20,0 g)
Aquae calcis	(15,0 g)
Aetherol. levend.	(1,0 g)
Paraff. liquid.	(ad 200,0 g)
Misce fiat suspensio	
D.S.: Külsőleg. Napolaj.	

Napkenőcs

Ung. hydrophil. anion.	(30,0 g)
Aquae calcis	(80,0 g)
Butyri cacao	(30,0 g)

Ung. emoll.	(30,0 g)
Vasel. cholest.	(20,0 g)
Cerae lanae	(20,0 g)
Tinct. benzoe	(2,5 g)
Misce fiat unguentum.	
D.S.: Külsőleg. Napkenőcs.	

Napégésre

Mentholi	(0,1 g)
Ol. lini	(50,0 g)
Aquae calcis	(50,0 g)
Misce fiat solutio	
D.S.: Külsőleg. Napégésre.	

Massage krém 1.

Lanolini	(20,0 g)
Paraff. liquid.	(100,0 g)
Vasel. albi	(200,0 g)
Butyri cacao	(20,0 g)
Cerae albae	(20,0 g)
Aquae dest.	(50,0 g)
Misce fiat unguentum.	
D.S.: Külsőleg. Massage krém.	

Lanolin tej

Cerae lanae	(60,0 g)
Stearini	(80,0 g)
Paraff. liquid.	(140,0 g)
Triaethanolamini	(30,0 g)
Aquae dest.	(169,0 g)
Aetherol. citrici	(1,0 g)
Sol. cons.	(20,0 g)
Misce fiat suspensio	
D.S.: Külsőleg. Lanolin tej.	

Lemosó tej

Lanolini	(30,0 g)
Stearini	(40,0 g)
Paraff. liquid.	(70,0 g)
Triaethanolamini	(12,0 g)
Aqae dest.	(700,0 g)
Aetherol. citrici	guttas quinque (V)
Misce fiat suspensio	
D.S.: Külsőleg. Lemosó tej.	

Kénes rázókeverék 1.

Sulf. praecip.	(5,0 g)
Talci	(12,0 g)
Zinc. oxyd.	(12,0 g)
Glycerini	(20,0 g)
Alc. dil. 70%	(20,0 g)
Aqua dest.	(30,0 g)
Misce fiat suspensio	
D.S.: Külsőleg. Rázókeverék.	

Kakaóvajás kenőcs

Cerae lanae	(20,0 g)
Alc. cethylstearyl.	(20,0 g)
Ol. ricini	(20,0 g)
Glycerini	(4,0 g)
Stearini	(7,0 g)
Cholesterini	(1,4 g)
Natr. borici	(3,0 g)
Methyl paraoxybenz.	(1,2 g)

Triethanolamini	(2,0 g)
Butyri cacao	(10,0 g)
Aquae dest.	(250,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg.	

Kénés rázókeverék2.

Sulfur. praecip.	(10,0 g)
Zinc. oxyd.	(20,0 g)
Spir. saponat	(20,0 g)
Alc. 90%	(150,0 g)
Misce fiat suspensio	
D.S.: Külsőleg. Rázókeverék.	

Kamillás arcszesz

Mentholi	(0,1 g)
Acid. salic.	(2,0 g)
Resorcini	(2,0 g)
Tinct. chamomill.	(5,0 g)
Alc. dil. 70%	(91,0 g)
Misce fiat solutio	
D.S.: Külsőleg.	

Massage krém 2.

Alc. cethylstearyl.	(40,0 g)
Butyri cacao	(36,0 g)
Cetacei	(20,0 g)
Cerae albae	(20,0 g)
Ol. jecoris	(10,0 g)
Ol. helianthi	(90,0 g)
Vasel. cholest.	(14,0 g)
Aquae dest.	(300,0 g)
Natr. tetrabor.	(2,0 g)
Methyl. paraoxybenz.	(6,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg. Massage krém.	

Mitesszer elleni kenőcs

Acid. salic.	(0,5 g)
Sulf. praecip.	(3,0 g)
Ung. emoll.	(30,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg.	

Lábpuhító krém

Ol. ricini	(25,0 g)
Ol. Vitamin - A	(10,0 g)
Sol. Canesten	(20,0 g)
Inj. „Vitamin – E”	(Amp. orig. No. V.)
Ung. ad manum	(ad 300,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg.	

Izzadás elleni ecsetelő

Acid. bor.	(3,0 g)
Mentholi	(1,0 g)
Talci	(5,0 g)
Zinc. oxyd.	(5,0 g)
Alc. dil. 70%	(ad 100,0 g)
M. f. solutio	
D.S.: Külsőleg.	

Helia D normál bőrre

Vasel. albi	(4,5 g)
Paraff. liquid.	(9,3 g)
Ol. ricini	(12,0 g)
Alc. aetylstearyl.	(16,2 g)
Stearini	(18,0 g)
Ol. helianthi	(54,0 g)
Natr. laurylsulf.	(1,5 g)
Sol. cons.	(4,0 g)
Sorbiti	(9,3 g)
Glycerini	(21,0 g)
Aquae dest.	(165,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg.	

Hidratáló 1.

Cholesterini	(2,0 g)
Stearini	(1,0 g)
Natr. tetrabor.	(1,0 g)
Glycerini	(3,0 g)
Lanolini	(9,0 g)
Alc. cetylstearyl.	(9,0 g)
Ol. ricini	(9,0 g)
Nipagini [seu Sol. cons.]	(0,10 g)
Aquae dest.	(80,0 g)
Inj. „Vitamin – E”	(Amp. No. I.)
Inj. „Vitamin A+D2”	(Amp. No. I.)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg.	

Hidratáló 2.

Ung. hydrophil. non-ion.	(50,0 g)
Aquae dest.	(50,0 g)
Inj. „Vitamin B12 [300 mikrogr.]”	(Amp. No. III.)
Aetherol. lavandulae	(gutt. No. III.)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg.	

Hajhullásra

Ol. ricini	(2,0 g)
Alc. dil.	70%(300,0 g)
Tinct. capsici	(10,0 g)
Inj. „Depersolon”	(Amp. No. III.)
M. f. solutio	
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.	

Hajszesz 1.

Inj. „Hydrocortison”	(Amp. No. I.)
Alc. dil. 70%	(100,0 g)
M. f. solutio	
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.	

Hajszesz 2.

Resorcini	(2,0 g)
Tinct. capsici	(10,0 g)
Spir. salic.	(88,0 g)
M. f. solutio	
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.	

Napozó

Cholesterini	(1,5 g)
Cerae lanae	(60,0 g)
Butyri cacao	(30,0 g)

Aquae dest.	(60,0 g)
Aquae calcis	(100,0 g)
Paraff. liquid.	(ad 450,0 g)
M. f. cremor	
D.S.: Külsőleg. Napozó krém.	

E vitaminos krém

Cerae lanae	(30,0 g)
Alc. cetylstearyl.	(30,0 g)
Cholesterini	(2,0 g)
Nipagini [seu Sol. cons.]	(1,8 g)
Stearini	(10,0 g)
Ol. ricini	(30,0 g)
Triaethanolamini	(3,0 g)
Glicerini	(10,0 g)
Aquae dest.	(310,0 g)
„Inj. Vitamin – E”	(Amp. No. II.)
M. f. cremor	
D.S.: Külsőleg.	

Arctej 1.

Cerae lanae	(30,0 g)
Stearini	(40,0 g)
Triaethanolamini	(12,0 g)
Aquae dest.	(700,0 g)
Paraff. liquid.	(70,0 g)
M. f. cremor	
D.S.: Külsőleg.	

Vitaminos arckrém

Ung. hydrophil. non-ion.	(100,0 g)
Cerae lanae	(10,0 g)
Paraff. liquid.	(20,0 g)
Triaethanolamini	(3,0 g)
Aquae dest.	(100,0 g)
Ol. Vigantol	(1,0 g)
Inj. „Vitamin – E” [1 ml.]	(Amp. No. I.)
Inj. „Panthenol” [2 ml.]	(Amp. No. I.)
Ol. „Vitamin – A”	(3,0 g)
M. f. cremor	
D.S.: Külsőleg. Arckrém.	

Szemránckrém

Cerae lanae	(5,0 g)
Cerae flavae	(2,5 g)
Alc. cetylstearyl.	(2,5 g)
Ol. ricini	(4,0 g)
Ol. helianthi	(4,0 g)
Natr. tetrabor.	(1,0 g)
Methyl. paraoxybenz.	(0,20 g)
Aquae dest.	(20,0 g)
Vasel. cholest.	(60,0 g)
Ol. „Vitamin – A”	(1,0 ml.)
M. f. cremor	
D.S.: Külsőleg. Szemránckrém.	

Sol. kalii permanganici FoNo V.

Kalii permang.	(2,0 g)
Aquae dest.	(ad 50,0 g)
M. f. solutio	
D.S.: Külsőleg.	

Theophyllines gyermekkúp

Theophyllini	(0,02 g)
--------------	----------

Adeps. sol. quant. sat.
 Dentur tales doses No. X. (decem)
 D.S.: Naponta 1-2 kúpot a végbélbe helyezni.
 Húvös helyen tartandó.

Decoct. sapon. pro inf.

Tinct. sapon.	(2,0 g)
Aquae dest.	(80,0 g)
Sir. simpl.	(20,0 g)
Spir. anisat.	(gtt. No. V.)
Sol. cons.	(1,0 g)

M. fiat solutio
 D.S.: 2 óránként 2 kávéskanálnyit bevenni.

Gyermek pepsines (étvágyjavító)

Acid. chlor. dil. 10%	(2,0 g)
Pepsini	(2,0 g)
Sir. rubi idaei	(30,0 g)
Aquae dest.	(ad 100,0 g)

M. fiat solutio
 D.S.: 1 evőkanálnyit 1/2 pohár vízben étkezés közben elfogyasztani. Étvágyjavító.

Hidratáló kenőcs

Ung. hydrophil. non-ion.	(30,0 g)
Ung. hydros.	(30,0 g)
Sol. acid. bor.	(40,0 g)
Inj. „Vitamin - B12 300 mikrogr.”	(Amp. No. II.)
Inj. „Vitamin - E”	(Amp. No. I.)
Olei „Vitamin - A”	(1,0 ml)

M. f. unguentum
 D.S.: Külsőleg. Hidratáló Kenőcs.

Bőrkeményedésre

Ung. emoll.	(25,0 g)
Aquae dest.	(10,0 g)
Ung. „Ftorocort”	(Tub. orig. No. I.)

M. fiat unguentum
 D.S.: Külsőleg. Bőrkeményedésre.

CNS hüvelykúp (Fluorra jó) (Cs.Sz.Zs.)

Chloramphenicoli	(0,10 g)
Nystatini	(0,10 g)
Sulfadimidini	(0,10 g)

Massa macr. qu. s.
 Dent. tal. dos. No. X. (decem)
 D.S.: E:1 hüvelykúp

Arctonik (Pattanásos bőrre)

Acid. bor.	(3,0 g)
Acid. salic.	(2,0 g)
Camph.	(1,0 g)
Tinct. chamomill.	(10,0 g)
Alc. conc.	(30,0 g)
Aquae dest.	(60,0 g)

M. f. solutio
 D.S.: Külsőleg. Arctonik, pattanásos bőrre.

Arckrém

Ung. hydrophil. non-ion.	(50,0 g)
Aquae dest.	(60,0 g)
Ol. helianthi	(5,0 g)
Aetherol. citri	(gtt. X. [decem])

M. fiat cremor
D.S.: Külsőleg. Arckrém.

Arctej

Cerae lanae	(30,0 g)
Stearini	(40,0 g)
Ol. helianthi	(70,0 g)
Triethanolamini	(15,0 g)
Aquae dest.	(845,0 g)
Inj. „Vitamin – E”	(Amp. No. V. [quinque])

M. fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Arctej.

Fájdalomcsillapító kenőcs

Cerae flav.	(16,0 g)
Paraff. liquid.	(24,0 g)
Vasel. flavi	(40,0 g)
Mixturae aetherolei	(20,0 g)

M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Fájdalomcsillapító kenőcs.
Ind.: Analgeticum, antirheumaticum, viszketés, rovarcsípés ellen.
Lejárat: 6 hónap.

Mixt. aetherol.

Aetherol. cinnamoni	(1,0 g)
Aetherol. caryophylli	(3,0 g)
Aetherol. levendulae	(3,0 g)
Aetherol. menthae pip.	(5,0 g)
Aetherol. eucalypti	(10,0 g)
Camphori	(3,0 g)
Mentholi	(75,0 g)

Misce fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x

Fejfájás elleni por

Drotaverini chlor. seu Papaverini chlor.	(0,5 g)
Acid. ascorb.	(1,0 g)
Coffein. citric.	(1,0 g)
Noraminophen. natr. mes.	(4,0 g)

Misce fiat pulvis
Div. in dos. aeq. No. X. (decem)
D.S.: Szükség esetén étkezés után 1 port bevenni.
Max. napi dózis: 3x1
Ind.: Analgeticum, dysmenorrhoea, gyomor- és bélcsatorna görcsös fájdalma.
Lejárat: 6 hónap.

Fájdalomcsillapító

Codeini	(2,0 g)
Phenobarbitali	(3,0 g)

Massae pilulae quantum satis
Divide in doses aequ. No. C. (centum)
D.S.: Fájdalomcsillapító pilula. Szükség esetén 1x1.
Max. napi dózis: 3x1

Izomláz elleni por

Thiamin. chlor.	(0,50 g)
Natr. dihydrogenphosph.	(5,0 g)
Glycosi	(5,0 g)
Acid. ascorb.	(10,0 g)

Misce fiat pulvis
Div. in dos. aequ. No. XX. (viginti)
D.S.: Izomláz elleni por. Napi 2-3x1 por, étkezés közben,
vagy izommunkát megelőzően 2-3 nappal napi 1-2 por.
Lejárat: 1 hónap.

Sportkrém

Methyl. salicyl.	(28,0 g)
Mentholi	(10,0 g)
Hydrogel. methylcell.	(40,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion.	(62,0 g)
M. f. unguentum	
D.S.: Külsőleg. Sportkrém.	

Antisepticus hintőpor

Nystatini	(0,80 g)
Acid. bor.	(20,0 g)
Talci	(80,0 g)
M. f. pulvis	
D.S.: Külsőleg. A fertőzött bőrfelületre naponta 2x.	
Ind: Antimycoticum, antisepticum.	
Lejárat: 6 hónap.	

Gomba elleni ecsetelő 1.

Acid. bor.	(0,5 g)
Acid. salic.	(1,50 g)
Ammon. bitumensulf.	(2,0 g)
Balsami peruviani	(2,0 g)
Sol. iod. alc.	(5,0 g)
Tinct. benzoe	(9,0 g)
M. f. solutio	
D.S.: Külsőleg. A gombás bőrfelületre naponta 2x.	
Ind: Antimycoticum. Seborrhoea, eczema, pruritus esetén. Keratoplasticus hatású is.	
Lejárat: 1 hónap.	

Gomba elleni ecsetelő 2.

Acid. salic.	(1,50 g)
Acid. benzoic.	(3,0 g)
Sol. iod. alcohol.	(5,0 g)
Spir. camph.	(40,50 g)
M. f. solutio	
D.S.: Külsőleg. A gombás bőrfelületet naponta 2x ecseteljük.	
Ind.: Antimycoticum, antisepticum.	
Lejárat: 1 hónap.	

Gomba elleni ecsetelő 3.

Camphori	(2,0 g)
Acid. salic.	(4,0 g)
Resorcini	(4,0 g)
Glycerini	(20,0 g)
Tinct. benzoe	(20,0 g)
Alcohol. dil. 70%	(70,0 g)
M. f. solutio	
D.S.: Külsőleg. A gombás bőrfelületet naponta 2-3x ecseteljük.	
Ind.: Antimycoticum, acne, seborrhoea, ekzema ellen.	
Lejárat: 6 hónap.	

Gombásodás elleni hintőpor

Natr. benzoic.	(5,0 g)
Zinc. oxyd.	(5,0 g)
Talci	(40,0 g)
M. f. sparsorium	
D.S.: A fertőzött bőrfelületet tisztítás és szárítás után naponta 2x behintjük.	
Ind.: Antimycoticum. Moniliasis ellen.	
Lejárat: 6 hónap.	

Lábgombásodás elleni hintőpor

Camphori	(1,0 g)
Acid. salic.	(1,50 g)

Acid. boric.	(5,0 g)
Alumenii	(5,0 g)
Talci	(43,75 g)
Zinc. oxyd.	(43,75 g)
M. f. sparsorium	

D.S.: Neomagnolos lábmosás után a lábakat szárazra törölni, behinteni 2x naponta.

Ind.: Antimycoticum, moniliasis ellen.

Lejárat: 6 hónap

Nystatinos, gomba elleni kenőcs

Nystatini	(1,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion.	(99,0 g)
M. f. unguentum	

D.S.: Külsőleg. Naponta 2x, legfeljebb 10 napon át.

Ind.: Antimycoticum, moniliasis, soor, candida fertőzés esetén.

Penta-oldat

Acid. salic.	(0,40 g)
Iodi	(0,40 g)
Kalii iodati	(0,40 g)
Glycerinum borax. FoNo	(4,0 g)
Tinct. benzoe	(ad 40,0 g)
M. f. solutio	

D.S.: Külsőleg. A gombás felületre ecsetelő, naponta 2x.

Ind.: Antimycoticum. Aphtha, herpes esetén is alkalmazható.

Lejárat: 6 hónap.

Nystatinos szájecsetelő 1.

Nystatini	(3,30 g)
Sorbiti	(25,0 g)
Mucil. metylcell.	(30,0 g)
Sol. cons.	(1,0 g)
Aquae dest.	(ad 100,0 g)
M. f. solutio	

D.S.: Külsőleg. Legfeljebb 10 napon át, étkezés után a szájat ecsetelni.

Jav.: Antimycoticum, stomatologicum, soor fertőzés esetén.

Nystatinos szájecsetelő 2.

Nystatini	(0,5 g)
Glycerinum borax. FoNo	(29,5 g)
M. f. solutio	

D.S.: Külsőleg. Szájecsetelésre, étkezés után, naponta 2x.

Jav.: Antimycoticum. Soor kezelésére.

Lejárat: 1 hónap.

Szájpenész elleni ecsetelő csecsemőnek I.

Metylrosanilin. chlor.	(0,25 g) seu (0,5 g)
Aquae dest.	(ad 50,0 g)
M. f. solutio	

D.S.: Külsőleg. Szájecsetelésre, étkezés után, naponta 2x.

Szájpenész elleni ecsetelő csecsemőnek II.

Metilini parahydroxibenzoici	(0,60 g)
Propylenglycoli	(19,40 g)
M. f. solutio	

D.S.: Külsőleg. Szájecsetelésre, étkezés után, naponta 2x.

Antiflogisztikus kenőcs

Ung. „Hydrocortison 1%”	(10,0 g)
Ung. „Phlogosam”	(10,0 g)
Ung. hydrophil. anion.	(50,0 g)
M. f. unguentum	

D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.

Ind.: Allergiás dermatitis, eczema, antiflogisztikum.

Szteroidos cink - ichtiol kenőcs

Ung. „Ftorocort” (15,0 g)

Ammonii bitumensulf. (1,0 g)

Zinc. oxyd. (2,0 g)

Vasel. albi (17,0 g)

M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.

Ind.: Gyulladásos bőrbetegségek, eczema, égés, fagyás esetén.

Szteroidos hűtőkenőcs

Ung. „Flucinar” (30,0 g)

Ung. alum. acet. tart. (70,0 g)

M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.

Ind.: Eczema, allergiás dermatitis esetén. Gyulladáscsökkentő, hűsítő.

Hígított szteroidos hűtőkenőcs

I.

Ung. „Ftorocort” (30,0 g)

Alum. acet. tart. sol. (1,0 g)

Ung. hydrophil. non-ion. (19,0 g)

M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.

Ind.: Gyulladásos, allergiás bőrbetegség, eczema, pruritus ani.

II.

Ung. „Hydrocortison 2,5%” (5,0 g)

Alum. acet. tart. sol. (2,5 g)

Ung. hydrophil. anion. (42,5 g)

M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.

Ind.: Allergiás dermatitis, eczema, hűsítő, összehúzó, enyhe desinficiens.

Hígított szteroidos-kénes kenőcs

Ung. „Hydrocortison 2,5%” (5,0 g)

Sulf. pp. (2,0 g)

Alum. acet. tart. sol. (2,5 g)

Ung. hydrophil. anion. (42,5 g)

M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.

Ind.: Allergiás dermatitis, eczema. Keratoplasticus, enyhe desinficiens.

Kamillosan kenőcs

Ung. „Azulenol” (20,0 g)

Ung. alum. acet. tart. (30,0 g)

Ung. hydrophil. non-ion. (50,0 g)

M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg.

Ind.: Dermatologicum. Antiphlogisticum. Égési, fagyási sebek, felfekvések hámosodásának elősegítésére.

Klionos kenőcs fogászati célra

Metronidazoli (2,5 g) seu „Tabl. Klion” No. X. (decem)

Olei „Vitamin – A” (2,0 ml.)

Ung. „Neogranormon” (20,0 g)

M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg. Gézlappra kenve, szájnálkahártyára helyezve 10 perces helyi pakoláshoz.

Ind.: Stomatitisben, hámképződés elősegítése.

Scabies ellen ecsetelő

I.

Natr. thiosulf. (20,0 g)

Aqua dest. (80,0 g)

Misce fiat solutio

D.S.: Külsőleg. Bekenésre, naponta 1-2x. 10 perc várakozás után langyos szappanos fürdő.

II.

Acid. chlor. dil. (20,0 g)

Aqua dest. (80,0 g)

Misce fiat solutio

D.S.: Külsőleg. Bekenésre, naponta 1-2x. Rövid várakozás után langyos szappanos fürdő.

Rühkenőcs

Sulf. pp. (40,0 g)

Calc. carb. (60,0 g)

Vasel. flavi (240,0 g)

M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg. Scabies ellen. A kenőcsöt bedörzsölni, rövid várakozás után langyos szappanos fürdő.

Kezelés 5 napon át.

Bizmut paszta

Bism. subgall. (2,0 g)

Anyli tritici (5,0 g)

Talci (5,0 g)

Vasel. cholest. (ad 50,0 g)

M. f. pasta

D.S.: Külsőleg. Emlőrhagadok kezelésére, naponta 2x, szoptatás előtt olajos vattával, majd langyos szappanos vízzel lemosni.

Ind.: Sebfelület szárító adstringens és antisepticum.

Impetigo kenőcs

Clioquinoli (1,0 g)

Acid. salic. (2,0 g)

Vasel. cholest. (97,0 g)

M. f. unguentum

D.S.: Az olajjal megtisztított bőrfelületet naponta 2x vékonyan bekenni (víz ne érje.)

Ind.: Dermatologicum, antisepticum. Ótvar pörkök eltávolítására.

Száritó hintőpor

Acid. bor. (3,0 g)

Acid. salic. (3,0 g)

Acid. tannic. (5,0 g)

Zinc. oxyd. (25,0 g)

Talci (64,0 g)

M. f. sparsorium

D.S.: Külsőleg. Naponta 2-3x.

Ind.: Adstringens, antisepticum, viszketéscsillapító és szárító hatású.

Száritó kenőcs

Bolus albae (5,0 g)

Zinc. oxyd. (30,0 g)

Cerae lanae (10,0 g)

Vasel. flavi (20,0 g)

Olei jecori aselli (25,0 g)

Vanillini (0,05 g)

M. f. unguentum

D.S.: Külsőleg. Naponta 1-2x.

Ind.: Dermatologicum, hámosító kenőcs. Gyerekeknek és decubitusban szenvedőknek is alkalmazható.

Száritó paszta

Bism. subgall. (10,0 g)

Zinc. oxyd. (10,0 g)

Amylum. tritici	(10,0 g)
Cerae lanae	(10,0 g)
Ol. helianthi	(10,0 g)
M. f. pasta	

D.S.: Külsőleg. Naponta 1-2x gézlapra kenve kezeljük a sebfelületet, olajos vattával tisztítjuk.

Ind.: Adstringens, antisepticum, szárító hatású.

Ichtiol - szalicil kenőcs

Acid. salic.	(0,5 g)
Sulf. pp.	(2,0 g)
Acid. bor.	(5,0 g)
Zinc. oxyd.	(10,0 g)
Talci	(20,0 g)
Vasel. flavi	(27,5 g)
Cerae lanae	(30,0 g)
Ammon. bitumensulf.	(5,0 g)
M. f. unguentum	

D.S.: Külsőleg. A kenőcsöt szesszel vagy szaliciles szesszel megtisztított bőrre kenjük, este 1x.

Ind.: Dermatologicum, antiseborrhoicum.

Hintőpor himlőhólyag kezelésére

Camphori	(1,0 g)
Mentholi	(1,0 g)
Bism. subgall.	(5,0 g)
Zinc. oxyd.	(10,0 g)
Talci	(33,0 g)
M. f. sparsorium	

D.S.: Külsőleg.

Ind: Dermatologicum. Himlőhólyag viszketés csillapítására.

Norcainos hintőpor

Mentholi	(0,75 g)
Benzocaini	(1,5 g)
Magnes. carb. hydroxyd.	(20,0 g)
Talci (ad 100,0 g)	
M. f. sparsorium	

D.S.: Külsőleg. A fájdalmas, viszkető, fekélyes sebre naponta többször rászórni.

Gyerekeknél naponta legfeljebb 3x.

Ind.: Dermatologicum. Fekélyes sebek kezelésére. Hűsítő, szárító, viszketéscsillapító.
